

Notes systématiques et synonymiques sur les Clérides.

(2^{me} Communication sur les Clérides),

par

J. B. CORPORAAL. (Amsterdam).

Tillus notatus KLUG, Clerii 1842, p. 276 = *distinctus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. (d'après le type, conservé au British Museum) = *quadricolor* HELLER, Philipp. Jrn. Sc. XIX, no. 5, 1921, p. 534, pl. I, f. 9.

Pallenis ruficollis KUW., Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479 (type dans le Musée R. OBERTHUR) appartient au genre *Cladiscus*. J'ai capturé quelques exemplaires de cette espèce près Medan (Sumatra). M. Drescher en a trouvé un exemplaire à Noesa Kambangan (Java).

Stenocylidrus obsoletus J. THOMS., Mus. Scient. 1860, p. 48 = *S. undatus* Coq., Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, t. 7, f. 4. (cf. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388).

Callimerus Dohertyanus GORH., Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572. (June 20, 1893.) = *quadriarcuatus* KUW., Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 484. (publié avec le Comptes-Rendu de la Séance du 2 Septembre 1893).

Callimerus ornatus GORH., Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 110, (type au Musée de Leiden) = *niveus* GORH., Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572 = *albotessellatus* KUW., Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893, p. 483. (type au Musée R. OBERTHUR).

Callimerus mysticus GORH., Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 571 = *Drescheri* SCHENKL., Ent. Mitt. IV, 1915, p. 111. (d'après le type unique, au Deutsch. ent. Mus. à Dahlem).

- Callimerus latifrons* GORH., Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67 = *flavofasciatus* SCHENKL, Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.
- Callimerus mirandus* GORH., Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65 = *hexagonus* Chapin, Proc. Biol. Soc. Wash. XXXII, 1919, p. 229. (M. Chapin m'a confirmé dans une lettre l'exactitude de cette synonymie).
- Callimerus bellus* GORH., Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574; l.c. 1902, II, pl. XXII, f. 53. = *fenestratus* Chapin, Proc. Biol. Soc. Wash. XXXII, 1919, p. 232; HELLER, Philipp. Jrn. Sc. XIX, no. 5, 1921, p. 532, pl. I, f. 4.
- Stigmatium centrale* GORH., Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. appartient au genre *Ommadius*.
- Stigmatium gabonicum* THOMS., Arch. Ent. II, 1858, p. 81, est identique avec *Cardiostichus Mechowi* Quedf., Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 269. (Les deux types se trouvent dans le Musée R. OBERTHUR). L'espèce devra donc s'appeler *Cardiostichus gabonicus* J. THOMS.
- Anthicoclerus pallipes* GORH., Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 182, localisé aux îles Philippines, me paraît être une bonne espèce, et non comme le veut. M. SCHENKLING (Ent. Mitt. V, 1916, p. 221.) une aberration de l'*A. anthicoides* WESTW. Il s'en distingue par la taille un peu plus grande, par le corps plus aplati, par la couleur jaune de la moitié apicale du dernier article des antennes et par les poils plus denses, surtout sur les élytres. Dans mes exemplaires la partie majeure des cuisses est jaune claire; les genoux, les tibias et les tarses sont bruns foncés ou noirs.
- Pseudoclerops bicingulatus* KUW., Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404. (type au Musée R. OBERTHUR) = *Hemitrachys bizonatus* GORH., Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92.
- Tenerus abbreviatus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 52 = *ruficollis* MAC LEAY, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 275.